

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА АНЕМАК (ANEMAK)

СОСТАВ И УПАКОВКА

Сироп из экстрактов растительных трав в виде коричневой вязкой жидкости (допускается легкий осадок и помутнение) с характерным запахом в оригинальных флаконах по 100 мл с защитной пломбой – (1) пачки картонные с защитной фирменной голографической наклейкой; (2) ложка–дозатор; (3) инструкция по применению.

	100 мл
Экстракт крапивы двудомной (<i>Urtica dioica</i> L.)	20 мг.
Экстракт элеутерококка (<i>Eleutherococcus senticosus</i>)	10 мг.
Экстракт тысячелистника (<i>Achillea millefolium</i> L.)	10 мг.
Экстракт алоэ (<i>Aloe arborescens</i> Mill.)	10 мг.
Экстракт череды (<i>Bidens tripartita</i>)	10 мг.

ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА

- При приеме препарата происходит постепенная регрессия клинических и лабораторных симптомов анемии;
- Восстанавливает дефицит железа в организме и стимулирует синтез гемоглобина при железодефицитных анемиях;
- Повышает всасывание железа в кишечнике.
- Является источником железа и незаменимых аминокислот;
- Помогает бороться со слабостью, депрессии, частую утомляемость, головокружения, повышает защитные силы организма;

ПОКАЗАНИЯ

- Анемия (железодефицитные состояния различного степени тяжести);
- В12 дефицитная анемия;
- Беременность и период лактации (профилактика недостатка железа в периоды беременности и кормления грудью);
- Задержка физического, умственного развития и интенсивного роста;
- Занятия спортом и физкультурой, интенсивный физический труд;
- Скудное питание, несбалансированный рацион;
- Частые ОРВИ и ОРЗ (в составе комплексной терапии);
- Донорство;
- Больным после различных оперативных вмешательств;
- При длительных кровотечениях;
- У детей в подростковом возрасте и у взрослых (например, вегетарианцев и пожилых людей);
- Профилактика железодефицитной анемии у пациентов, относящихся к группе риска в случае, когда нет возможности обеспечить достаточное поступление в организм железа с пищей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость к отдельным ингредиентам препарата.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.

ДЕТЯМ ОТ 3 ДО 12 ЛЕТ	ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ СТАРШЕ 12 ЛЕТ
по 2,5-5 мл 2 раза в день	по 5-10 мл 2 раза в день

Препарат применяется внутрь 5-10 минут после еды.

Продолжительность приема обычно составляет 30 дней.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Перед применением нужно тщательно взболтать.

После вскрытия флакона хранить в прохладном месте. Не нагревать и не замораживать.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможно в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к отдельным ингредиентам препарата.

При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В настоящее время о случаях передозировки не выявлено.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от +2°C до +25°C.

Срок годности 24 месяцев.