

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

БРОНХОДОКС (BRONXODOKS)

СОСТАВ И УПАКОВКА

Сироп из экстрактов растительных трав в виде коричневой вязкой жидкости с характерным запахом (допускается легкий осадок и помутнение) в оригинальных флаконах по 150 мл с защитной пломбой – (1) пачки картонные с защитной фирменной голографической наклейкой; (2) ложка – дозатор; (3) инструкция по применению.

Экстракт шалфея (<i>Salvia officinalis</i> L.)	10 мг.
Экстракт солодки (<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.)	10 мг.
Экстракт мать-и-мачехи (<i>Tussilago</i> L.)	10 мг.
Экстракт алоэ (<i>Aloe arborescens</i> Mill.)	5 мг.
Экстракт подорожника (<i>Plantago</i> L.)	5 мг.

ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА

Бронходокс - представляет собой комбинированный препарат с противокашлевым и бронхорасширяющим действием. Оказывает подавляющее действие на кашлевой центр, не влияя на дыхание. Обладает слабым бронхоспазмолитическим и секретолитическим действием. Возбуждает дыхание, расширяет бронхи и уменьшает их отек слизистой оболочки. Оказывает противовоспалительное и слабое противомикробное действие.

ПОКАЗАНИЯ

Бронходокс применяют в комплексной терапии при лечении:

- Острых и хронических бронхитов;
- Трахеобронхитов;
- Бронхиальной астмы;
- Бронхоэктатической болезни;
- Санации бронхиального дерева в пред – и послеоперационный период;
- Ателектаза (при закупорке бронхов слизистой пробкой);
- Пневмонии;
- Коклюше;
- Туберкулезе;
- Для устранения симптомов кашля и бронхоконстрикции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость к отдельным ингредиентам препарата.
Гиперацидный гастрит. Беременность. Период лактации.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.

ДЕТЯМ ОТ 3 ДО 12 ЛЕТ	ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ СТАРШЕ 12 ЛЕТ
по 2,5-5,0 мл 3 раза в день	По 5,0-7,5 мл 3 раза в день

Препарат применяется внутрь 10-15 минут после еды.

Курс приема составляет 14 дней

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Перед применением нужно тщательно взболтать.

После вскрытия флакона хранить в прохладном месте. Не нагревать и не замораживать.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможно: в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к отдельным ингредиентам препарата.

При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В настоящее время о случаях передозировки не выявлено.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от +2°C до +25°C.

Срок годности 24 месяцев.