

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

ДЕНТОВИТАЛ (DENTOVITAL)

СОСТАВ И УПАКОВКА

Сироп из экстрактов растительных трав в виде коричневой вязкой жидкости (допускается легкий осадок и помутнение) с характерным запахом в оригинальных флаконах по 150 мл с защитной пломбой – (1) пачки картонные с защитной фирменной голографической наклейкой; (2) ложка – дозатор; (3) инструкция по применению.

| | |
|---|--------|
| Экстракт шалфея (<i>Salvia officinalis</i> L.) | 15 мг. |
| Экстракт солодки (<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.) | 15 мг. |
| Экстракт тысячелистника (<i>Achillea millefolium</i>) | 10 мг. |
| Экстракт ромашки (<i>Matricaria</i>) | 10 мг. |
| Экстракт календулы (<i>Caléndula officinális</i>) | 10 мг. |

ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА

- Противомикробное и противовоспалительное;
- Вяжущее и антисептическое;
- Местное анестезирующее.

ПОКАЗАНИЯ

Дентовитал применяют в лечении и профилактике инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта:

- Стоматиты: острый, афтозный, бактериальный, язвенно-эрозивный;
- Пародонтит: легкие, средние, тяжелые;
- Гингивиты: острый, хронический, язвенно-некротический, атрофический;
- Флюс (одонтогенный периостит). Цинга (в комплексном терапии);
- Гигиеническая обработка съемных протезов;
- Для устранения неприятного запаха полости рта.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость к отдельным ингредиентам препарата.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.

Для полоскания полости рта разбавить 10-15 мл препарат на 100 гр. воды при комнатной температуре.

При острых заболеваниях можно увеличить дозу до 30 мл препарата.

Рекомендуется полоскание ротовой полости 3-4 раза в сутки или каждый раз после еды.

Курс приема составляет 7 дней.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Перед применением нужно тщательно взболтать.

После вскрытия флакона хранить в прохладном месте. Не нагревать и не замораживать.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможно в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к отдельным ингредиентам препарата.

При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В настоящее время о случаях передозировки не выявлено.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от +2°C до +25°C. Срок годности 24 месяцев.