



ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ФОРТАЛИВ (FORTALIV)

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

Таблетки круглые из растительных трав, с характерным запахом, двояковыпуклые, светло – коричневого цвета, с вкраплениями. 60 шт. по 0.5 гр. Флаконы полиэтиленовые с защитной пломбой или упаковано в блистерах. (1) – пачки картонные с защитной голографической наклейкой, (2) – инструкция по применению.

Состав: Бессмертник песчаный (*Helichrysum arenarium* L), Репешок обыкновенный (*Agrimonia eupatoria* L.), Кукурузные рыльца (*Stigmata Maydis* L.), Пижма (*Tanacetum vulgare* L.), Расторопша пятнистая (*Silybum marianum* L.).

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА

Комплексный растительный гепатопротектор. Способствует регенерации печеночных клеток и стимулирует их биосинтетическую функцию. Снижает влияние токсинов на печеночные клетки и устраняет симптомы дискинезии желчевыводящих путей. Способствует улучшению аппетита и нормализации пищеварения. Обладает желчегонным, антиоксидантным, противовоспалительным и легким мочегонным действием.

ПОКАЗАНИЯ

Препарат показан:

- при хронических и острых (в период реконвалесценции) гепатитах различной этиологии (вирусных, лекарственных, алкогольных и др.);
- при циррозах печени и предцирротических состояниях (в составе комплексной терапии);
- при жировой дистрофии печени и дискинезии желчевыводящих путей;
- при холецистите.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к одному или нескольким компонентам препарата.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.

Дети с 3-х лет	Взрослым
по 1 таблетке 2 раза в день за 5-10 минут до еды.	по 2 таблетки 3 раза в день за 5-10 минут до еды.

Обычно при хронических заболеваниях курс лечения составляет 20 – 30 дней.

При необходимости возможен повторный курс.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Обычно не возникают, в подавляющем большинстве случаев препарат переносится хорошо.

В случае индивидуальной повышенной чувствительности к одному или нескольким компонентам препарата возможны аллергические реакции, диспепсические расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта.

При развитии реакции повышенной чувствительности, применение препарата необходимо прекратить.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

О случаях передозировки препарата Форталив не сообщалось.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре от +2°C до +25°C.

Срок годности – 2 года.

Адрес: 1000011, Ташкентская область, Ташкентский район

Тел.: +998 (95) 195-59-00

E-mail: info@anfa.uz, www.anfa.uz