



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ГАСТИРАК (GASTIRAK)

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

Таблетки круглые из растительных трав и их плодов, с характерным запахом, двояковыпуклые, светло – коричневого цвета, с вкраплениями. 60 шт. по 0.5 гр. Флаконы полиэтиленовые с защитной пломбой или упаковано в блистерах. (1) – пачки картонные с защитной голографической наклейкой, (2) – инструкция по применению.

Состав: Аир болотный (*Acorus calamus*), Подорожник (*Plantago L*), Орех грецкий (*Júglans régia*), Алоэ (*Aloe L.*), Ромашка (*Matricaria L*), Мелисса лекарственная (*Melissa officinalis L.*).

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА

Гастирак – комбинированный препарат, обладающий антацидным, вяжущим, спазмолитическим и слабительными свойствами. Способствует к уменьшению активности пепсина и к снижению кислотности желудочного сока. Оказывает репаративное, бактерицидное и противовоспалительное действие, образуя на слизистой оболочке желудка защитную пленку. Активные вещества алоэ и корневища аира характеризуются спазмолитической активностью, мелисса оказывает слабительное действие.

ПОКАЗАНИЯ

- Гиперацидный гастрит;
- Неязвенная диспепсия;
- Гастро – эзофагально - рефлюксная болезнь;
- Язвенная болезнь 12-перстной кишки и желудка, включая ЯБ, ассоциированный с *Helicobacter pylori*.
- Гастралгия, отрыжка кислым;
- Изжога различной этиологии;
- Препарат применяют также для симптоматической терапии болей в желудке, возникших вследствие нарушения диеты, злоупотребления алкоголем, курения и терапии лекарственными препаратами, которые оказывают раздражающее действие на слизистую оболочку желудка.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к одному или нескольким компонентам препарата.

Почечной недостаточность.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

| Взрослые | Детям с 6-12 лет |
|--------------------------------|------------------------------|
| по 1-2 таблетке 3 раза в сутки | по 1 таблетки 3 раза в сутки |

Гастирак рекомендуется принимать через 30-60 минут после еды, предварительно измельчая таблетки, запивая 100 мл воды. Обычно продолжительность курса лечения - от одного до трех месяцев, курс терапии можно повторить спустя месяц после окончания предыдущего курса лечения.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Обычно не возникает, в подавляющем большинстве случаев препарат переносится хорошо. В случае индивидуальной повышенной чувствительности к одному или нескольким компонентам препарата возможны аллергические реакции.

При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

О случаях возникновения нежелательных явлений в результате передозировки препарата Гастирак не выявлено.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре от +2°C до +25°C. Срок годности – 2 года.

Адрес: 1000011, Ташкентская область, Ташкентский район

Тел.: +998 (95) 195-59-00

E-mail: info@anfa.uz, www.anfa.uz