

ГОРЛОЗИН (GORLOZIN)

СОСТАВ И УПАКОВКА

Сироп из экстрактов растительных трав в виде коричневой вязкой жидкости (допускается легкий осадок и помутнение) с характерным запахом в оригинальных флаконах по 150 мл с защитной пломбой – (1) пачки картонные с защитной фирменной голографической наклейкой; (2) ложка –дозатор; (3) инструкция по применению.

Экстракт Солодки (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	30 мг.
Экстракт Календулы (<i>Calendula officinalis</i>)	10 мг.
Экстракт Ромашки (<i>Matricaria chamomilla</i>)	10 мг.
Экстракт Куркумы (<i>Curcuma longa</i>)	10 мг.
Экстракт Имбиря (<i>Zingiber officinale</i>)	10 мг.
Экстракт перца Кубебы (<i>Piper cubeba L.</i>)	10 мг.
Экстракт Алоэ (<i>Aloe arborescens</i>)	10 мг.

ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА

- Проявляет фунгицидную и виростатическую активность;
- Обладает противовоспалительным, антисептическим и антибактериальными эффектами;
- Повышает иммунитет;
- Солодка и календула уменьшает боль, способствует расслаблению, снимает воспаление, обволакивает, способствует выведению мокроты и дает антисептический эффект;
- Ромашка – снимает воспаление слизистой глотки и миндалин;
- Куркума длинная – снимает воспалительный процесс, уничтожает микробы;
- Имбирь лекарственный – снимает воспаление;
- Перец кубебы – снимает воспаление, способствует отторжению мокроты;
- Алоэ – снимает воспалительный процесс, помогает восстановлению тканей.

ПОКАЗАНИЯ

- Для комплексного устранения хронических и острых тонзиллитов (для обработки слизистой оболочки полости рта у пациентов с инфекционно-воспалительными заболеваниями ротовой полости);
- Острый ларингит;
- Острый тонзиллит неуточненный (ангина агранулоцитарная);
- Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации;
- Хронический, атрофический фарингит;

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость к отдельным ингредиентам препарата.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.

Внутрь:

Детям в возрасте от 1 года до 6 лет	Детям в возрасте от 7 до 12 лет	Взрослым и подросткам старше 12 лет
по 1,0-2,0 мл 3 раза в день.	по 2,0-2,5 мл 3 раза в день	по 2,5-5,0 мл 3 раза в день

Для достижения терапевтического эффекта следует принимать не менее 15 дней.

Наружно: В виде полосканий при:

Ларингит и тонзиллите -- полоскать горло (разведенный с очищенной водой 1:6) раствором 6-10 раз в сутки

ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ ГОРЛА:

- При полоскании голову необходимо запрокидывать назад, при этом язык максимально высовывать вперед для того, чтобы раствор проходил как можно глубже в глотку.
- Раствор для полоскания должен быть теплым, так как холодная вода только ухудшит состояние, а горячая вода может вызвать ожоги и лишнюю боль, и стресс для больного.
- Для улучшения орошения миндалин, чтобы корень языка не мешал прохождению раствора, можно произносить звук Ы.
- Важным условием правильного полоскания является время проведения процедуры, как минимум 30 секунд необходимо на каждое полоскание, чтобы жидкость смогла тщательно промыть гортань.
- Чтобы не проглатывать раствор, важно уметь контролировать дыхание.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Перед применением нужно тщательно взболтать.

После вскрытия флакона хранить в прохладном месте. Не нагревать и не замораживать.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможно в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к отдельным ингредиентам препарата.

При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В настоящее время о случаях передозировки не выявлено.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от +2°C до +25°C.

Срок годности 24 месяцев.