

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

ИММУНОРОК (IMMUNOROK)

СОСТАВ И УПАКОВКА

Сироп из экстрактов растительных трав в виде коричневой вязкой жидкости (допускается легкий осадок и помутнение) с характерным запахом в оригинальных флаконах по 150 мл с защитной пломбой – (1) пачки картонные с защитной фирменной голографической наклейкой; (2) ложка – дозатор; (3) инструкция по применению.

Экстракт Родиолы розовой (<i>Rhodiola rosea</i>)	30 мг.
Экстракт Мята перечной (<i>Mentha piperita</i>)	10 мг.
Экстракт Эхинацеи пурпурной (<i>Echinacea purpurea</i> (L.))	20 мг.
Экстракт Солодки (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	10 мг.
Экстракт Девясила (<i>Inula helénium</i>)	10 мг.
Экстракт Шиповника (<i>Rosa majalis</i>)	20 мг.

ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА

- Иммуномодулирующий эффект препарата осуществляется за счет активации гуморального и клеточного звеньев иммунитета;
- Эффективен в отношении вирусов гриппа, парагриппа, герпесвирусов, энтеровирусов, ротавирусов;
- Стимулирует бактерицидную активность нейтрофильных гранулоцитов;

ПОКАЗАНИЯ

- Астенические состояния невротические и соматоформные расстройства;
- Облегчение симптомов неосложненных вирусных и бактериальных заболеваний;
- Лечение острой и хронической герпетической и цитомегаловирусной инфекций;
- Снижение физической работоспособности;
- Профилактика и лечение инфекций при иммунодефицитных состояниях;

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость к отдельным ингредиентам препарата.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.

Детям в возрасте от 1 года до 6 лет	Детям в возрасте от 7 до 12 лет	Взрослым и детям старше 12 лет
по 1,0-1,5 внутрь 3 раза в день.	по 1,5-2,5 мл внутрь 3 раза в день	по 2,5-5,0 мл внутрь 3 раза в день

Препарат принимается 10-15 минут после еды

Для достижения терапевтического эффекта следует принимать не менее 15 дней.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Перед применением нужно тщательно взболтать.

После вскрытия флакона хранить в прохладном месте. Не нагревать и не замораживать.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможно в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к отдельным ингредиентам препарата.

При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В настоящее время о случаях передозировки не выявлено.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от +2°C до +25°C. Срок годности 24 месяцев.