

МИГРЕНАЗ - L (MIGRENAZ - L)

СОСТАВ И УПАКОВКА

Таблетки круглые из растительных трав и их плодов, с характерным запахом, двояковыпуклые, светло – коричневого цвета, с вкраплениями. 60 шт. по 0.5 гр. Флаконы полиэтиленовые с защитной пломбой или упаковано в блистерах. (1) – пачки картонные с защитной голографической наклейкой, (2) – инструкция по применению.

Состав: Валериана лекарственная (*Valeriana officinalis*), Мята перечная (*Méntha piperíta*), Гинко билоба (*Gĩnngo*), Ландыш майский (*Convallária majális*), Тмин обыкновенный (*Fructus Carvi*), Боярышник красный (*Crataégus sanguinea*).

ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА

- Улучшает мозговое кровообращение и снабжение мозга;
- Влияет на обмен веществ в клетках, реологические свойства крови и улучшает периферическое кровообращение и микроциркуляцию;
- Оказывает выраженное противоотечное действие на уровне головного мозга и в периферических тканях;
- Антистрессорное действие проявляется в нормализации постстрессового поведения, соматовегетативных нарушениях, восстановлении циклов сон-бодрствование, нарушенных процессов обучения и памяти, снижении дистрофических и морфологических изменений в различных структурах головного мозга.

ПОКАЗАНИЯ

Мигреназ - L применяют при лечении и профилактике:

- острых и хронических нарушениях мозговых кровообращений;
- легкой черепно-мозговой травме; (легкое сотрясение головного мозга)
- синдром вегето-сосудистой дистонии; (ВСД, нейроциркуляторная дисфункция)
- легких когнитивных расстройств атеросклеротического генеза;
- расстройствах памяти и мыслительной деятельности;
- головокружениях, шуме в ушах, чувстве страха;
- нарушении периферического кровообращения и микроциркуляции (в т.ч. артериопатия нижних конечностей и детской ортопедии), синдроме Рейно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость к отдельным ингредиентам препарата.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.

Детям в возрасте от 4 до 12 лет: по 1 таб. 3 раза в день.

Взрослым и детям старше 12 лет: по 1 таб. 3 раза в день

Внутри за 5-10 минут до еды.

Курс лечения не менее 3 месяца (особенно для пациентов пожилого возраста).

Проведение повторного курса возможно после консультации с врачом.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможно в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к отдельным ингредиентам препарата.

При появлении побочных эффектов, в том числе не указанных в инструкции, следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В настоящее время о случаях передозировки не выявлено.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от +2° С до +25°С. Срок годности 24 месяцев.