

TARKIBI VA CHIQARILISH SHAKLI

Tabiiy o'simliklar va ularning mevasidan tarkib topgan, o'ziga xos hidga ega tabletkalar – shakli dumaloq, ikki tomoni qabariq, och jigarrang tusda. 0,5 gr.dan 60 dona. Himoyalovchi plombali polietilen flakonda yoki blisterda qodoqlangan. (1) – himoyalovchi golografik yorliqli karton o'ramlar, (2) – qo'llash bo'yicha yo'riqnomasi.

Tarkibi: Dorivor valeriana (Valeriána officinális), Qalampiryalpiz (Méntha piperítá), Ginko biloba (Gínkgo), Marvaridgul (Convallária majális), Oddiy zira (Fructus Carvi), Qizil do'lana (Crataégus sanguínea).

PREPARATNING TA'SIRI

- Miyada qon aylanishi va miyaning ozuqalanishini yaxshilaydi;
- Hujayralarda moddalar almashinuviga, qonning periferik va mikrosirkulyatsiyasiga, shu bilan birga qonning reologik xususiyatiga ham ijobjiy ta'sir ko'rsatadi;
- Bosh miya, mushak va bez to'qimalarida shishga qarshi ta'sir ko'rsatadi;
- Stressga qarshi ta'sir ko'rsatadi, stressdan keyingi holatlarni, organizm o'sishidagi buzilishlarni, uyqu-tetiklik funksiyasini, ta'lim va xotira jarayonlari buzilishlarini, bosh miyaning turli qismlarida distrofik va morfologik o'zgarishlar pasayishini yaxshilaydi.

QO'LLANILISHI

Migrenaz – L;

- Miya qon aylanishining o'tkir va surunkali buzilishlari;
- Bosh miyaning yengil chayqalishlari;
- Organizmda qon bosimi pasayishi sindromi (VSD, neyrosirkulyator disfunksiya);
- Arteriya qon tomirlari devorlari (aterosklerotik) kasallanishiga bog'liq bo'lgan, yengil kognitiv buzilishlar;
- Xotira va aqliy faoliyatning buzilishi;
- Bosh aylanishi, quloq bitishi, qo'rquv hissi;
- Dissirkulyator ensefalopatiyaning turli shakllari;
- Qonning periferik va mikrosirkulyatsiyasining buzilishlari (shu qatorda, qo'l-oyoq arteriopatiyasi va bolalar ortopediyasi) va Reyno sindromini davolashda va profilaktikasida qo'llaniladi.

QO'LLASH MUMKIN BO'LМАGAN HOLATLAR

Preparatning ba'zi tarkibiy ingrediyentlariga yuqori sezuvchanlik.

QO'LLASH USULI VA DOZALARI

Davolanish muddati va preparat miqdori, davolovchi shifokor tomonidan har bir bemorga yakka tartibda belgilanadi.

4 yoshdan 12 yoshgachabo'lgan bolalarga: 1 tabletkadan kuniga 3 mahal.

Kattalarga va 12 yoshdan katta bolalarga: 1 tabletkadan kuniga 3-4 mahal.

Ichkariga, ovqatlanishdan 5-10 minut oldin.

Davolanish davomiyligi 3 oy (ayniqsa, keksa yoshdagilarga).

Qayta davolanish kursi shifokor maslahatidan so'ng amalga oshiriladi.

NOJO'YA TA'SIRI

Preparatning ba'zi tarkibiy ingrediyentlariga organizm sezuvchanligi yuqori bo'lgan holatlarda, allergik reaksiyalar ehtimoli mavjud.

Preparatning nojo'ya ta'sirilari kuzatilsa, preparatni qo'llashdan to'xtatish va shifokorga murojaat qilish kerak.

PREPARATNING ME'YORDAN ORTIQ QABUL QILINISHI

Preparatni me'yordan ortiq qabul qilinishi oqibatida paydo bo'ladigan noxush holatlar aniqlanmagan.

BOSHQA PREPARATLAR BILAN O'ZARO TA'SIRI

Boshqa dori vositalari bilan qo'llanilganda nojo'ya ta'siri aniqlanmagan.

SAQLASH SHAROITI VA YAROQLILIK MUDDATI

Preparat bolalar qo'li yetmaydigan, yorug'likdan himoyalangan joyda +2 S-dan +25°S-gacha haroratda saqlanishi lozim. Saqlanish muddati – 24 oy.