



A N F A
PHARMACEUTICALS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА СИЛОПИК (SILOPIK)

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

Сироп из растительного сырья в виде коричневой вязкой жидкости с характерным запахом в оригинальных флаконах по 150 мл (допускается легкое помутнение) с защитной пломбой – (1) пачки картонные с защитной фирменной голографической наклейкой; (2) ложка –дозатор; (3) инструкция по применению.

Состав:

Экстракт якорца стелящиеся (Rheum officinale)	300 мг.
Экстракт Солодки (Glycyrrhíza glábra)	200 мг.

ДЕЙСТВИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Силопик — препарат растительного происхождения. Обладает противомикробным, противосклеротическим, противовоспалительным, сосудорасширяющим, антикоагулянтным действием. Также регулируют водно-солевой баланс и оказывают стимулирующее воздействие на мужские половые железы.

Силопик — гипохолестеринемическое средство. Его применение тормозит всасывание холестерина в кишечнике, уменьшает свертываемость крови, повышает тонус тонкого кишечника и стимулирует его сокращения. Стимулирует потенцию. Считается укрепляющим, тонизирующим средством.

Силопик — принимают при запорах, для стимуляции желчеотделения, в качестве мочегонного средства.

Силопик — способна справиться с мигренями, бессонницей, простудами и даже шумом в ушах и гонореей.

Силопик — при наружном применении считается эффективным ранозаживляющим средством, способным справиться даже с ожогами, ее применяют при конъюнктивитах, протирают им кожу, стремясь избавиться от акне, грибка, воспалений.

При лечении сексуальной дисфункции:

- Увеличит уровня тестостерона (общего и свободного);
- Улучшает сексуального здоровья, либидо и эрекции;
- Улучшает различных параметров мужской спермы, таких как подвижность, криволинейная скорость, жизнеспособность;
- Увеличит качества спермы;
- Способствует для лечения сексуальной дисфункции у женщин (и в период менопаузы);
- Рекомендовано принимать при циститах, пиелонефритах, уретритах, прочих воспалениях мочеполовой системы.

При снижении уровня холестерина:

- Уровень холестерина снижается в основном за счет снижения ЛПНП (липопротеины низкой плотности), не оказывая существенного влияния на ЛПВП (липопротеины высокой плотности);

При снижении давления:

- Способствует снижению диастолического артериального давления;
- Способствует снижению головной боли, головокружения, бессонницы, снижение сердцебиения;

При лечении ИБС (Ишемическая болезнь сердца):

- разжижает кровь и улучшает результатов ЭКГ;

При снижении уровня сахара в крови:

- препарат показал высокую эффективность в снижении уровня глюкозы больных диабетом 2 типа. Механизм снижения сахара связан с ингибированием активности а-глюкозидазы в тонком кишечнике;
- снижает гликирование белков;

- имеет легкий ингибирующий альфа-амилазу эффект, не зависящий от дозы, что говорит о эффективности применения с очень маленькими дозировками;
- обладает ингибирующим липазу свойствами, что может быть полезным для снижения веса, за счет сжигания жира у больных диабетом.

Как мочегонный эффект:

- Исследование показало увеличение диуреза в течение дня на 200 мл.

При применении в спорте:

- снижает процент жира в организме, значительно увеличит мышечной массы, а также повышение уровня дигидротестостерона;
- способствует легче перенести тяжелые физические, умственные и психические нагрузки, повысить сопротивляемость организма при тяжелых болезнях;

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- беременность; людям моложе 16 лет.
- неврогенные и эндокринные запоры; синдром «острого живота»; аппендицит; аденома предстательной железы.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.

Принимают внутрь, после еды.

При снижении либидо, импотенции и бесплодии. У мужчин со сниженным либидо, импотенцией и бесплодием рекомендуется дозировка по 10–15 мл 3 раза в сутки. Продолжительность лечения — не менее 90 дней. Курс лечения можно повторять до получения положительного терапевтического эффекта.

У женщин с эндокринным бесплодием рекомендуется дозировка по 5–10 мл 3 раза в сутки с 1-го по 12-й день менструального цикла.

Этот курс можно повторять периодически до наступления беременности.

Дислипотеинемия. По 10 мл 3 раза в сутки. Продолжительность лечения — не менее 3 мес.

Климактерический и посткастрационный синдром у женщин. По 5–10 мл таблетки 3 раза в сутки в течение 60–90 дней.

После улучшения состояния постепенно переходят к поддерживающей дозе — по 5 мл в сутки в течение 1–2 лет.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Перед применением нужно тщательно взболтать.

После вскрытия флакона хранить в прохладном месте. Не нагревать и не замораживать.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможно в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к отдельным ингредиентам препарата.

При появлении побочных эффектов, в том числе не указанных в инструкции, следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В настоящее время о случаях передозировки не выявлено.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от +2°C до +25°C.

Срок годности 24 месяцев.

Адрес: 1000011, Ташкентская область, Ташкентский район

Тел.: +998 (95) 195-59-00

E-mail: info@anfa.uz, www.anfa.uz