



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ТРОМБОРОН (ХОЛЕСТЕРОН)

### СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

Таблетки круглые из растительных трав и их плодов, с характерным запахом, двояковыпуклые, светло – коричневого цвета, с вкраплениями. 60 шт. по 0.5 гр. Флаконы полиэтиленовые с защитной пломбой или упаковано в блистерах. (1) – пачки картонные с защитной голографической наклейкой, (2) – инструкция по применению.

**Состав:** Гинкго билоба (*Ginkgo L.*), Пиретрум девичий (*Tanacetum parthenium L.*), Чеснок (*Allium sativum L.*), Имбирь лекарственный (*Zingiber officinale*), Дягиль лекарственный (*Archangelica officinalis*).

### ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА

ТРОМБОРОН предназначен для очищения сосудов от лишнего холестерина при гиперлипидемии IIa типа. ТРОМБОРОН достоверно снижает уровень общего холестерина, уменьшает концентрацию ЛПНП («плохого») и улучшает концентрацию «хорошего» холестерина который жизненно необходим человеку для правильного функционирования головного мозга и производства гормонов, таких как тестостерон и эстроген.

ТРОМБОРОН применяют в качестве профилактики для защиты сосудов сердца и мозга от холестерина. Начинать профилактику рекомендуется всем – с 35-40 лет. При регулярном приеме «ТРОМБОРОН» выводит холестерин из организма и препятствует его отложению на стенках сосудов в виде атеросклеротических бляшек. Более того, «ТРОМБОРОН» нормализует проницаемость сосудистой стенки.

### ПОКАЗАНИЯ

Препарат Тромборон назначается при:

- Гиперлипидемия IIa типа по Фредериксону, слабовыраженная;
- профилактика острого инфаркта миокарда при наличии факторов риска (таких как сахарный диабет, гиперлипидемия, артериальная гипертензия, ожирение, курение, пожилой возраст);
- вторичная профилактика инфаркта миокарда;
- нестабильная стенокардия;
- профилактика инсульта (в т.ч. у пациентов с преходящими нарушениями мозгового кровообращения);
- профилактика тромбозов после операций и инвазивных вмешательств на сосудах (таких как аортокоронарное шунтирование, эндартерэктомия сонных артерий, артериовенозное шунтирование, ангиопластика сонных артерий);
- профилактика тромбоза глубоких вен и тромбозов легочной артерии и ее ветвей (например, при длительной иммобилизации в результате обширного хирургического вмешательства).

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Беременность и период лактации.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, заболевания печени, выраженные нарушения функции почек, алкоголизм.

### РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.

Тромборон рекомендуется принимать:

Внутрь: по 2 таблетке 2–3 раз в день за полчаса до еды.

Длительность лечения препаратом (от 3 до 6 месяцев) определяется индивидуальной реакцией больного на лечение. Проведение повторного курса лечения возможно по рекомендации врача.

### ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Обычно не возникает, в подавляющем большинстве случаев препарат переносится хорошо.

Возможны аллергические реакции (кожный зуд, сыпь), а также тошнота, головная боль, ощущение горечи во рту.

При появлении побочных эффектов, в том числе не указанных в инструкции, следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

### ПЕРЕДОЗИРОВКА

О случаях возникновения нежелательных явлений в результате передозировки препарата не сообщалось.

### ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Данные о взаимодействии с какими-либо лекарственными средствами отсутствуют.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре от +2°C до +25°C. Срок годности – 2 года.