



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

### ВЕТРОГОНИН (VETROGONIN)

#### СОСТАВ И УПАКОВКА

Сироп из экстрактов растительных трав в виде коричневой вязкой жидкости (допускается легкий осадок и помутнение) с характерным запахом в оригинальных флаконах по 150 мл с защитной пломбой – (1) пачки картонные с защитной фирменной голографической наклейкой; (2) ложка – дозатор; (3) инструкция по применению.

Экстракт Ромашки аптечной ( <i>Matricaria chamomilla</i> L.)	20 мг.
Экстракт Чабрец ползучего ( <i>Thymus vulgaris</i> L.)	20 мг.
Экстракт Мята перечной ( <i>Mentha piperita</i> L.)	20 мг.
Экстракт Зверобоя продырявленного ( <i>Hypericum perforatum</i> L.)	20 мг.
Экстракт Девясила высокого ( <i>Inula helenium</i> L.)	20 мг.
Экстракт Тысячелистника обыкновенного ( <i>Achillea millefolium</i> L.)	20 мг.
Экстракт Фенхеля обыкновенного ( <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.)	20 мг.

#### ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА

- ромашка - используется при спазмах кишечника, метеоризме и диарее, а также как потогонное средство;
- чабрец-при назначении препаратов из травы растения у больных исчезают боли в животе, нормализуется пищеварение, улучшается отхождение газов;
- в листьях мяты перечной – ментол: расширяет кровеносные сосуды сердце, легких и головного мозга;
- зверобой-настой из травы используются как вяжущее и антисептическое средство при желудочно-кишечных заболеваниях;
- девясил - помогает при болезнях как желудка, так и кишечника – таких как язва, гастрит, поносы неинфекционного характера и колиты;
- в плодах фенхеля и тимьяна — эфирное масло, флавоноиды, фитонциды;
- тысячелистник обладает антибактериальным и противовоспалительным свойством. Растение оказывает положительное действие на внутренние органы человека, а также оно способствует образованию слизи, избавляет от газов в кишечнике

#### ПОКАЗАНИЯ

- избыточное образование и скопление газов в ЖКТ: симптомы метеоризма (чувство распирания и переполнения в подложечной области, вздутие кишечника), аэрофагия, диспепсия;
- кишечные колики у новорожденных и грудных детей;
- повышенное газообразование после операций;

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость к отдельным ингредиентам препарата.

#### РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.

#### При метеоризме и коликах:

Новорожденным и грудным детям	Детям от 1 года до 6 лет	Детям от 7 лет до 12 лет	Взрослым и детям старше 12 лет
По 0,5-1,0мл во время кормления или до/после каждого кормления	По 1,0-2,5 мл. 3-4 раз в сутки	По 2,5-5,0мл 3-4 раз в сутки	По 5,0-7,5 мл. 3-4 раз в сутки

При отравлениях моющими средствами назначают взрослым по 5,0–10,0 мл, детям – по 1,0-5,0 мл сиропа в зависимости от тяжести отравления. Препарат принимается до или после еды.

Курс приема составляет 14 дней. Повторный курс через неделю.

#### ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Перед применением нужно тщательно взболтать.

После вскрытия флакона хранить в прохладном месте. Не нагревать и не замораживать.

#### ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможно в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к отдельным ингредиентам препарата.

При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить.

#### ПЕРЕДОЗИРОВКА

В настоящее время о случаях передозировки не выявлено.

#### ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ** Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от +2° С до +25°С. Срок годности 24 месяцев.