



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА АКИТОНОЗОЛ (AKITONOSOL)

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

Таблетки круглые из растительных трав и их плодов, с характерным запахом, двояковыпуклые, светло – коричневого цвета, с вкраплениями. 60 шт. по 0.5 гр. Флаконы полиэтиленовые с защитной пломбой или упаковано в блистерах. (1) – пачки картонные с защитной голографической наклейкой, (2) – инструкция по применению.

Состав: Дурнишник обыкновенный (*Xanthium strumarium*), Аир обыкновенный (*Acorus calamus*), Чеснок (*Allium sativum*), Ламинария - морская капуста (*Laminaria J.V.Lamour*), Чабрец обыкновенный (*Thymus serpyllum*), Шалфей лекарственный (*Salvia officinalis*), Грецкий орех (*Júglans régia*), Зверобой продырявленный (*Hypericum Perforatum L*).

Каждая таблетка содержит – **100 мкг** йода.

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА

Акитонозол – применяется для профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы. Микроэлемент йод относится к незаменимым микроэлементам, необходимым для осуществления нормальной работы щитовидной железы. Йод не синтезируется в организме, следовательно, все необходимое его количество должно поступать в организм извне. При поступлении оптимального количества йода, предотвращается развитие различных заболеваний щитовидной железы, в том числе и эндемического зоба. Препарат восполняет недостаток йода, получаемого организмом с продуктами питания, что особенно важно в эндемических зонах, т.е. в тех зонах, где в почве и т.п. количество йода недостаточно.

ПОКАЗАНИЯ

- Профилактика заболеваний щитовидной железы, обусловленных недостаточным поступлением йода в организм, а также для профилактики йододефицита у лиц, нуждающихся в повышенном потреблении йода (беременные, кормящие грудью матери, подростки и дети);
- В качестве профилактики рецидива зоба после операции на щитовидной железе или после окончания медикаментозного лечения зоба.
- Лечение ряда заболеваний вызванных недостаточным поступлением йода: диффузного нетоксического зоба, диффузного эутиреоидного зоба.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к одному или нескольким компонентам препарата.

Непереносимость препаратов йода.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.

Детям до 12 лет	Взрослым и детям старше 12 лет	Беременные и кормящие женщины
по 1 таблетке 1 раз в сутки утром во время еды.	по 2 таблетки 1 раз в сутки утром во время еды.	По 2-3 таблетки 1раз в сутки утром во время еды.

Продолжительность приёма обычно - от одного до трех месяцев, курс терапии можно повторить спустя месяц после окончания предыдущего курса.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Обычно не возникает, в подавляющем большинстве случаев препарат переносится хорошо. В случае индивидуальной повышенной чувствительности к одному или нескольким ингредиентам препарата возможны аллергические реакции.

При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

О случаях возникновения нежелательных явлений в результате передозировки препарата Акитонозол не выявлено.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре от +2°C до +25°C.

Срок годности – 2 года.

Адрес: 1000011, Ташкентская область, Ташкентский район

Тел.: +998 (95) 195-59-00

E-mail: info@anfa.uz, www.anfa.uz