

**АЛЛЕРГИДОН (ALLERGIDON)**

**СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА**

Сироп из экстрактов растительных трав в виде коричневой вязкой жидкости (допускается легкий осадок и помутнение) с характерным запахом в оригинальных флаконах по 150 мл с защитной пломбой – (1) пачки картонные с защитной фирменной голографической наклейкой; (2) ложка–дозатор; (3) инструкция по применению.

**Состав:**

Экстракт Огуречной травы ( <i>Borago officinalis</i> L.)	300 mg
Экстракт Фиалки ( <i>Viola arvensis</i> )	200 mg
Экстракт Одуванчика лекарственной ( <i>Taraxacum officinale</i> )	300 mg
Экстракт Ромашки ( <i>Matricaria chamomilla</i> L.)	200 mg

**ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА**

Препарат оказывает противовоспалительное и общеукрепляющее действие на организм, очищает кровь от аллергенов, нормализует деятельность внутренних органов:

- Укрепляет иммунитет;
- Повышает стойкость организма к аллергену;
- Защищает печень, на которую ложится основная нагрузка при аллергических реакциях;
- Снимает отечность, покраснения, высыпания на коже;
- Предупреждает появление слезоточивости, насморка и других симптомов аллергических реакций;
- Нормализует деятельность мочевыделительной системы, способствует быстрому выводу аллергенов из организма;
- Улучшает деятельность пищеварительной системы;
- Нормализует работу нервной системы;
- Снабжает организм необходимыми витаминами и микроэлементами;

**ПОКАЗАНИЯ**

Препарат Аллергидон назначается при:

- Сезонной аллергии (поллинозы), пищевой и лекарственной аллергии;
- Аллергические дерматологические заболевания (зудящие дерматозы, крапивница, псориаз, атопический дерматит, аллергическая экзема);
- Аллергические заболевания органов дыхания (аллергический бронхит, бронхиальная астма, аллергический ринит)
- Аллергический конъюнктивит.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Индивидуальная непереносимость к отдельным ингредиентам препарата.

**РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ**

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.

Аллергидон рекомендуется принимать:

Взрослым: по 15-20 мл. 2-3 раза в день.

Детям в возрасте до 6 лет: по 2,5 – 5мл. 2-3 раза в день.

Детям в возрасте от 6 до 12 лет: по 5-10 мл. 2-3 раза в день во время еды.

Продолжительность приёма - от одного до трех месяцев, курс терапии можно повторить спустя месяц после окончания предыдущего курса.

**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ**

Перед применением нужно тщательно взболтать.

После вскрытия флакона хранить в прохладном месте. Не нагревать и не замораживать.

**ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ**

Возможно в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к отдельным ингредиентам препарата.

При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить.

**ПЕРЕДОЗИРОВКА**

В настоящее время о случаях передозировки не выявлено.

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ**

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от +2°C до +25°C.

Срок годности 24 месяцев.