



A N F A
PHARMACEUTICALS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

ДЕРМОТОНАЛ (DERMOTONAL)

СОСТАВ И УПАКОВКА

Сироп из экстрактов растительных трав в виде коричневой вязкой жидкости (допускается легкий осадок и помутнение) с характерным запахом в оригинальных флаконах по 150 мл с защитной пломбой – (1) пачки картонные с защитной фирменной голографической наклейкой; (2) ложка – дозатор; (3) инструкция по применению.

Экстракт вербены лекарственной (<i>Verbena officinalis</i>)	10 мг.
Экстракт зверобоя продырявленного (<i>Hypericum perforatum</i>)	10 мг.
Экстракт тысячелистника (<i>Achillea millefolium</i>)	10 мг.
Экстракт ромашки (<i>Matricaria</i>)	10 мг.
Экстракт фиалки трехцветной (<i>Viola tricolor</i>)	10 мг.

ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА

- Антибактериальное;
- Антиаллергическое;
- Противогрибковое;
- Вяжущее, обволакивающее и адсорбирующее;
- Тонизирует и размягчает кожу.

ПОКАЗАНИЯ

Дермотонал применяют в лечении и профилактике:

- Жирной себореи лица;
- Сипа, золотухи (экссудативный диатез, кожный зуд);
- Дерматита, трофической язвы, фурункулы, абсцессов (гнойничковые заболевания кожи, экзема);
- Флегмонозных угрей;
- Кератодермии, трихофитии;
- Эндометрита, эндометриоза, фибромных кровотечений;
- Заболеваний матки, влагалища, цервикального канала (эрозия шейки матки);

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость к отдельным ингредиентам препарата.

Менструальный период.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.

Ванночки:	Младенцам 0-3 года: разбавить 1ст. ложка сиропа + 0,7 л в тёплой кипячёной воде. Детям 4-14 лет: разбавить 2 ст. ложки сиропа + 0,7 л в тёплой кипячёной воде. Взрослым: разбавить 1: 6 в тёплой кипячёной воде.
Примочки:	Тампон смоченный в разбавленном сиропом 1:10, наложить под повязку.
Полоскание:	Полость рта – разбавить 1ст. ложка сиропа 100 мл в тёплой кипячёной воде.
В гинекологии	Разбавить 1ст. ложка сиропа 200 мл в тёплой кипячёной воде.

Препарат предназначен только для наружного и местного применения.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Перед применением нужно тщательно взболтать.

После вскрытия флакона хранить в прохладном месте. Не нагревать и не замораживать.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможно в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к отдельным ингредиентам препарата.

При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В настоящее время о случаях передозировки не выявлено.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от +2°C до +25°C. Срок годности 24 месяцев.