



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА КАЛЬЦИДОКС-АНТИДИАТЕЗИН

СОСТАВ И УПАКОВКА

Таблетки круглые, двояковыпуклые, однородная масса, белого или светло-кремового цвета, без запаха. 60 шт. по 0,5 гр. Флаконы полиэтиленовые с защитной пломбой или упаковано в блистерах.(1)- пачки картонные с защитной голографической наклейкой, (2) – инструкция по применению.

Состав 1 таблетки:

Очищенная яичная скорлупа 0.3 гр.

- кальций 93% ; -фосфор 0,25%;

-магний 0,55%; -калий 0,08%;

-железо 0,18%; -натрий 0,03%;

Витамин D3. 1 МЕ(0,025мкг)

Сахар-песок 0.1 гр.

Крахмал 0.1 гр.

Группа: Комплекс кальция, фосфора и минералов.

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА

Эффективно способствует регуляции обмена кальция и фосфора в организме (в костях, зубах, волосах, мышцах).
Дополнительный источник кальция, фосфора и минералов в рационе взрослых и детей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Повышенная потребность в кальции (в период интенсивного роста, занятия спортом и др.); недостаток кальция в пище, несбалансированное и неполноценное питание (отсутствие в рационе молока и молочных продуктов); нарушение обмена кальция; укрепление и восстановление структуры костной ткани; профилактика и комплексное лечение рахита; несвоевременный рост зубов, кариес зубов; ломкость ногтей и волос; аллергия и диатез у детей раннего возраста; нормализация процесса заживления при переломах костей, хрупкость костей у пожилых людей, предотвращение развития остеопороза.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Нет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Младенцы и дети до 3-х лет	Дети от 3 до 12 лет	Взрослые и дети старше 12 лет
по 1 таблетке 2 раза в день или по рекомендации врача.	по 1 таблетке 3 раза в день.	по 2 таблетки 2 раза в день.

Внутрь, запивая водой, фруктовым соком или молоком, не зависимо от приема пищи.

Измельчив таблетку можно добавить в пищу (творог, йогурт, каша, пюре, десерт и т.п.).

Не добавлять в горячие блюда и не следует запивать чаем или кофе.

КУРС ПРИЕМА: 1 месяц.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Препарат очень хорошо переносится даже в тех случаях, когда его принимают в течение долгого времени.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Во время приема препарата «Кальцидокс-Антидиатезин» нет необходимости приёма других макро и микроэлементных препаратов, во избежание передозировки. С осторожностью при повышенном содержании солей кальция в крови и моче.

Беременные и кормящие женщины – могут принимать препарат по рекомендации врача.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре от +2°C до +25°C.

Срок годности – 2 года.

Адрес: 1000011, Ташкентская область, Ташкентский район

Тел.: +998 (95) 195-59-00

E-mail: info@anfa.uz, www.anfa.uz