

КАШЛИНЕТ (KASHLINET)

СОСТАВ И УПАКОВКА

Сироп из экстрактов растительных трав в виде коричневой вязкой жидкости (допускается легкий осадок и помутнение) с характерным запахом в оригинальных флаконах по 150 мл с защитной пломбой – (1) пачки картонные с защитной фирменной голографической наклейкой; (2) ложка –дозатор; (3) инструкция по применению.

Экстракт Ромашки (<i>Matricāria chamomīlla</i>)	20 мг.
Экстракт Верблюжьей колючки (<i>Alhagi</i>)	20 мг.
Экстракт Солодки (<i>Glycyrrhīza glābra</i>)	20 мг.
Экстракт Алтейки лекарственной (<i>Althaea officinalis</i>)	30 мг.

ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА

- Отхаркивающий;
- Противовоспалительный;
- Действует на слизистые оболочки дыхательных путей, разжижает мокроту и уменьшает ее вязкость;

ПОКАЗАНИЯ

Препарат Кашлинет назначается при острых и хронических воспалительных заболеваниях, которые сопровождаются с трудноотделяемыми кашлями с выделениями мокроты:

- при трахеите;
- при бронхите;
- при пневмонии;
- при бронхоэктатической болезни;
- при эмфиземе легких (у взрослых и детей в возрасте от 1 года, в таких случаях Кашлинет помогает улучшить и облегчить отхождение мокроты).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость к отдельным ингредиентам препарата.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Препарат предназначен для перорального применения.

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.

Детям в возрасте от 1 до 6 лет	Детям в возрасте от 7 до 12 лет	Взрослым и детям старше 12 лет
по 2,5мл (1/2 чайная ложка) 3 раза в день	по 2,5-5,0мл (1/2-1 чайная ложка) 3 раза в день	По 5,0-7,5мл (2-3 чайная ложка) 3 раза в день

Препарат принимают **независимо** от приема пищи.

Обычно длительность курса лечения составляет от 3 до 7 дней.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Перед применением нужно тщательно взболтать.

После вскрытия флакона хранить в прохладном месте. Не нагревать и не замораживать.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможно: в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к отдельным ингредиентам препарата.

При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В настоящее время о случаях передозировки не выявлено.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от +2°C до +25°C. Срок годности 24 месяцев.