

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА НОМАГИССАН (NOMAGISSAN)

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

Таблетки круглые из растительных трав и их плодов, с характерным запахом, двояковыпуклые, светло – коричневого цвета, с вкраплениями. 60 шт. по 0.5 гр. Флаконы полиэтиленовые с защитной пломбой или упаковано в блистерах. (1) – пачки картонные с защитной голографической наклейкой, (2) – инструкция по применению.

Состав: Ортилия однобокая (*Orthilia secūnda* L.), Душица обыкновенная – материнка (*Origanum vulgāre* L.), Плоды шиповника (*Fructus Rosāe*), Ромашка аптечная (*Matricāria chamomilla* L.), Календула лекарственная (*Caléndula officinālis* L.), Пастушья сумка (*Capsēlla bursa-pastōris* L.), Бессмертник песчаный (*Helichrýsum arenārium*).

ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА

Комплексный растительный регулятор менструального цикла. Способствует устранению постклимактерических кровотечений посредством стимуляции и укрепления мускулатуры эндометрия и ткани яичников. Имеет противовоспалительное и антибактериальное свойства. Помогает при предменструальном синдроме, так как, препарат контролирует и выравнивает гормональный уровень. Помогает обмену веществ, восстанавливает иммунитет (защитные свойства организма), а также имеет общеукрепляющие свойства.

ПОКАЗАНИЯ

- Дисменорея, аменорея, гиперменорея (в составе комплексной терапии)
- Предменструальный синдром
- Аномальные вагинальные выделения
- Постклимактерические кровотечения
- Белые выделения из влагалища, вызванные закупоркой желез шейки матки (Лейкорейя)
- Обильная менструация (Меноррагия)
- Маточные кровотечения, не связанные с менструальным циклом (Метроррагия)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к одному или нескольким компонентам препарата, беременность, период лактации.

РЕЖИМ ДОЗИРОВКИ

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.

По 2 таблетки 3 раза в день за 5-10 минут до еды.

При необходимости возможен повторный курс.

Продолжительность курса 15 дней.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Обычно не возникают, в подавляющем большинстве случаев препарат переносится хорошо. В случае индивидуальной повышенной чувствительности к одному или нескольким ингредиентам препарата возможны аллергические реакции, диспепсические расстройства со стороны желудочно – кишечного тракта.

При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

О случаях возникновения нежелательных явлений в результате передозировки препарата Номагиссан не сообщалось.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Данные о взаимодействии с какими-либо лекарственными средствами отсутствуют.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре от 2°C до +25°C.

Срок годности – 2 года.

Адрес: 1000011, Ташкентская область, Ташкентский район

Тел.: +998 (95) 195-59-00

E-mail: info@anfa.uz, www.anfa.uz