



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ПРОКУРИН (PROCURIN)

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

Таблетки круглые из растительных трав и их плодов, с характерным запахом, двояковыпуклые, светло – коричневого цвета, с вкраплениями 30 шт. по 0.5 гр. Флаконы полиэтиленовые с защитной пломбой или упаковано в блистерах. (1) – пачки картонные с защитной голографической наклейкой, (2) – инструкция по применению.

Состав: Гореч птичий (*Polygonum aviculare* L.), Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.), Девясиль высокий (*Inula helénium* L.), Зверобой продырявленный (*Hypericum perforatum* L.), Бессмертник песчаный (*Helichrysum arenarium* L.), Орех грецкий (*Juglans regia* L.), Щавель конский (*Rumex confertus* L), Мята перечная (*Mentha piperita* L.).

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА

Оказывает комплексное противодиарейное, вяжущее, противовоспалительное, дезинфицирующее действие. Обладает успокаивающим, спазмолитическим, антисептическим и болеутоляющим действием на слизистую желудочно-кишечного тракта. Противодиарейное действие достигается за счет уменьшения перистальтики и секреторной активности кишечника, а также ускоряется регенерация слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта. Оказывает антимикробное действие (действие, направленное на уничтожение микробов); нормализует кишечную флору.

ПОКАЗАНИЯ

Неспецифическая острая и хроническая диарея; диарея связанная с аллергическими реакциями; диарея вызванная психоэмоциональными факторами; диарея обусловленная изменением режима питания и привычного рациона; колит; дисбактериоз после приема антибиотиков широкого спектра действия (профилактика и лечение); энтерит, сопровождающийся поносом; метеоризм; в качестве вспомогательного средства при диарее инфекционного генеза.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Во время лечения исключить из рациона питания жирную пищу, приём алкоголя и бахчевых культур. Следует соблюдать диету, рекомендуются небольшие перерывы между приемами пищи с постепенным возвращением к исходному характеру питания, употреблять большое количество жидкости, избегать употребления приправ и ограничить приём мучных изделий.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к одному или нескольким компонентам препарата.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.

| Детям до 3 лет в виде лечебных клизм | Дети – с 3-х лет внутрь | Взрослым |
|--------------------------------------|--|--|
| на 100 мл воды 2 таблетки. | по 1 таблетке 3 раза в день за 5-10 минут до еды. | по 2 таблетки 3 раза в день за 5-10 минут до еды. |

Длительность лечения зависит от причины развития дисбактериоза и индивидуальных особенностей организма.

Обычно при хронических заболеваниях курс лечения составляет 5 – 10 дней.

При необходимости возможен повторный курс.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Обычно не возникает, в подавляющем большинстве случаев препарат переносится хорошо.

В случае индивидуальной повышенной чувствительности к одному или нескольким компонентам препарата возможны аллергические реакции.

При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

О случаях передозировки препарата Прокурин не выявлено.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре от +2°C до +25°C.

Срок годности – 2 года.

Адрес: 1000011, Ташкентская область, Ташкентский район

Тел.: +998 (95) 195-59-00

E-mail: info@anfa.uz, www.anfa.uz