

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА СОЛТОСТЕН (SOLTOSTEN)

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

Таблетки круглые из растительных трав, с характерным запахом, двояковыпуклые, светло – коричневого цвета, с вкраплениями. 60 шт. по 0.5 гр. Флаконы полиэтиленовые с защитной пломбой или упаковано в блистерах. (1) – пачки картонные с защитной голографической наклейкой, (2) – инструкция по применению.

Состав: Камнеломка болотная (*S. Hirculus L.*), Марена красильная (*Rubia tinctorum L.*), Хвощ полевой (*Equisetum arvense L.*), Почечный чай (*Folium Orthosiphonis L.*), Листья брусники (*Folium Vitis idaea L.*), Пол-пола (*Aerva lanata*), Горец птичий (*Polýgonum aviculáre L.*), Барбарис обыкновенный (*Folium Bérberis L.*)

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА

Оказывает спазмолитическое, мочегонное и противовоспалительное действие. Способствует отхождению камней различной природы при почечнокаменной болезни, нормализует солевой обмен.

ПОКАЗАНИЯ

Хронические воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей (пиелонефрит, пиелит, цистит, уретрит, простатит). Мочекаменная болезнь. Желчнокаменная болезнь, холециститы, холангиты. Мочекислый диатез. Остеохондроз, подагра.

А также препарат назначают в послеоперационный период после удаления почечных камней или их самостоятельного отхождения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к одному или нескольким компонентам препарата.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.

Дети – с 3-х лет	Взрослым
по 1 таблетке 2 раза в день за 5-10 минут до еды.	по 2 таблетки 2-3 раза в день за 5-10 минут до еды.

Обычно при хронических заболеваниях курс лечения составляет 20 – 30 дней.

При необходимости возможен повторный курс.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Обычно не возникают, в подавляющем большинстве случаев препарат переносится хорошо. В случае индивидуальной повышенной чувствительности к одному или нескольким ингредиентам препарата возможны аллергические реакции, диспепсические расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта.

При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

О случаях передозировки препарата Солтостен не выявлено.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Данные о взаимодействии с какими-либо лекарственными средствами не выявлено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре от +2°C до +25°C.

Срок годности – 2 года.

Адрес: 1000011, Ташкентская область, Ташкентский район

Тел.: +998 (95) 195-59-00

E-mail: info@anfa.uz, www.anfa.uz