

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ЗРЕНОДОЛ ЧЕРНИКА + (ZRENODOL CHERNIKA +)

СОСТАВ И УПАКОВКА

Сироп из экстрактов растительных трав и их плодов в виде не вязкой коричневой жидкости (допускается легкий осадок и помутнение) с характерным запахом в оригинальных флаконах по 150 мл с защитной пломбой – (1) пачки картонные с защитной фирменной голографической наклейкой; (2) ложка – дозатор; (3) инструкция по применению.

Экстракт плодов Черники (<i>Vaccinium myrtillus</i>)	30 мг.
Экстракт плодов Боярышника (<i>Crataegus</i>)	10 мг.
Экстракт Аира болотного (<i>Acorus calamus</i>)	10 мг.
Экстракт плодов Шиповника (<i>Rósa majális</i>)	10 мг.

ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА

Зренадол Черника + предохраняет глаза от усталости, раздражения и ослабления зрения; улучшает адаптацию зрения в темноте; снижает проницаемость капилляров, укрепляет стенки кровеносных сосудов, в том числе сосудов глазного дна, уменьшает отечность и красноту; поддерживает органы зрения необходимыми питательными веществами - витаминами и микроэлементами; оказывают положительное влияние на функциональное состояние органов зрения, связанное с дефицитом витаминов и микроэлементов, оказывает общеукрепляющее действие и является натуральным продуктом. Антоцианозиды черники способствуют регенерации светочувствительного пигмента сетчатки, повышая ее чувствительность к изменениям интенсивности света, улучшая остроту зрения при пониженной освещенности, способствуют улучшению адаптации зрения в темноте. Активные вещества черники улучшают гибкость клеточных мембран и помогают увеличить приток крови к сетчатке глаза. Экстракт черники и витамина С (основной компонент шиповника) с биофлавоноидами стимулируют циркуляцию крови в органах зрения, снижают внутриглазное давление и обладают выраженными антиоксидантными свойствами, т.е. предотвращают повреждение тканей глаза свободными радикалами. Кроме того, они оказывают противомикробное действие и способствуют заживлению повреждений.

ПОКАЗАНИЯ

Зренадол Черника + применяется:

- в комплексе мероприятий по профилактике ухудшения органов зрения;
- при повышенных зрительных нагрузках (работа за компьютером, длительное пребывание за рулем автомобиля или в условиях яркого солнечного освещения);
- в комплексной терапии сосудистых патологий глаз (катаракта, глаукома, миопия);
- пациентам с нарушениями сумеречного зрения («куриная слепота»).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость к отдельным ингредиентам препарата.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.

Детям от 3 до 6 лет	Детям от 7 до 14 лет	Взрослым и детям старше 14 лет
по 1,5- 2,0 мл. - 2 раза в день	по 2,5 мл. - 2 раза в день	по 5,0 мл.- 2 раза в день

Препарат принимается во время еды, запивая достаточным количеством воды.

Продолжительность приема – 1 месяц. Повторный курс через неделю.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Сироп перед применением нужно тщательно взболтать.

После вскрытия флакона хранить в прохладном месте. Не нагревать и не замораживать.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможно в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к отдельным ингредиентам препарата.

При развитии реакции повышенной чувствительности применение препарата необходимо прекратить.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В настоящее время о случаях передозировки не выявлено.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от +2° С до +25°С.

Срок годности 24 месяцев.