

LIPOVITILIN
PREPARATINI QO'LLASHGA DOIR YO'RIQNOMA

TARKIBI VA CHIQARILISH SHAKLI

Och jigarrang suyuqlik. 30 ml. Maxsus qopqoqli polietilen flakonda. (1) Himoyalovchi golografik yorliqli karton o'ram (2) Qo'llash bo'yicha yo'riqnomasi. 30 ml mahsulot tarkibida:

| | |
|-----------------------------|----------|
| YShQM olingan fosfolipidlar | 0.83 gr |
| YShQM olingan xolesterin | 0.15 gr |
| Mis sulfat | 0,003 gr |
| L-tirozin | 0,003 gr |
| α -tokoferol | 0,016 gr |
| Ruh sulfat | 0,003 gr |
| Suv | 29 gr |

TA'SIRI:

- melanin sintezini va zararlangan teri repigmentatsiyasini kuchaytiradi;
- teridagi moddalar almashinuvini nazorat qiladi;
- namlik darajasi va elastikligini oshiradi;
- toksinlarni zararsizlantiradi;
- terini yoshartirish xususiyatiga ega;

QO'LLANILISHI:

- Vitiligoda
- Terining turli kosmetik nuqsonlarida teri holatini yaxshilashga.

QO'LLASH MUMKIN BO'L MAGAN HOLATLAR:

Preparatning ba'zi tarkibiy qismalariga yuqori sezuvchanlik.

QO'LLASH USULI VA DOZALARI:

Vosita sirtga qo'llash uchun qo'llaniladi.

Kuniga 2 mahal terining shikastlangan qismiga sepiladi.

Davolanish kursi 6-8 xafka.

BOSHQA DORILAR BILAN O'ZARO TA'SIRI: kompleks terapiya tarkibida qo'llanilganda antioksidant, membranamodifikatsiyalovchi, melangostimulyatsiyalovchi ta'sirni kuchaytirish xususiyatiga ega.

HOMILADORLIK VA LAKTATSIYA: preparat homiladorlik va laktatsiya davrida qo'llanilishi mumkin.

ALOHIDA KO'RSATMALAR: Kuyish yoki allergik reaksiya holatlarida qo'llashni to'htatish lozim.

NOJO'YA TA'SIRI: kuzatilmagan.

SAQLASH SHAROITI:

Bolalar qo'li yetmaydigan, yorug'likdan himoyalangan joyda +10°С gacha haroratda germetik yopiq flakonlarda saqlanishi lozim.

Yaroqlilik muddati: 24 oy.